


Kind met Koorts

Kinderen hebben regelmatig koorts. Koorts is geen ziekte, maar een symptoom van mogelijk ernstig onderliggend ziekzijn, bijvoorbeeld sepsis. Bij kinderen jonger dan 3 maanden is koorts altijd reden voor onderzoek door een (huis)arts. Koorts zonder focus kan ook reden zijn voor een consult bij de huisarts. Veel ouders vinden hun kind suf bij koorts, vaak berust dat op gedrag anders dan ze gewend zijn. Medisch suf is: slap, bleek, niet zelf rechtop kunnen zitten, iets niet vast kunnen houden, kreunend huilen, geïrriteerd, ontroostbaar.



Vraag naar: leeftijd kind. Waar bevindt t kind zich en wat is het aan het doen. Leeftijd is belangrijk om snel te weten. Je past de urgentie vragen aan aan leeftijd, ook om de ernst in te schatten.

Triage criteria:

Mate van ziek zijn



Sinds wanneer ziek, hoe is het beloop, wat zijn de klachten, hoe hoog is de koorts? Wat doet t kind nog aan activiteiten.

vraag naar alarmsymptomen



Koorts > 38 bij babies tot 3 maanden (beleid zks, NHG?)
Petechien, nekstijfheid.
Aanhoudende koorts langer dan 5 dagen
Koorts bij immuungecompromiteerd kind
Koorts na ingreep (welke en wanneer)
Koorts onder AB behandeling
Koorts en tekenen van dehydratie
Output urine en ontlasting
Orale intake, hoeveel, hoe vaak, braken ed
Voorgeschiedenis en medicatie gebruik

Afhankelijk van bevindingen aan de telefoon verwijzen naar huisarts, poli of anders, bijvoorbeeld een advies geven.